

Gør mere for dine lipidpatienter

Familiær Hyperkolesterolæmi (FH)

Opsporing

LDL-C > 5 mmol/l (ubehandlet)¹⁾

OBS! Mistænk FH og **HENVIS** til familieudredning af hensyn til børn og nærmeste familie

Manifest kardiovaskulær sygdom og/eller diabetes med ≥ 1 risikofaktor og/eller organpåvirkning

Opfølgning

LDL-C > 1,8 mmol/l²⁾

OBS! Vær opmærksom på compliance / statinintolerans

Medicinsk behandling af LDL-C^{1,2)}

Atorvastatin 80 mg
eller højst tolereret dosis af statin
+/- ezetimibe

(PCSK9-hæmmer kan udskrives af specialist, hvis gældende kriterier er opfyldt)

Behandlingsmål for LDL-C^{1,2)}

LDL-C < 2,5 mmol/l (FH primær profylakse)

LDL-C < 1,8 mmol/l (sekundær profylakse)

Hvis LDL-C behandlingsmålet ikke nås

OBS! Vær opmærksom på høj udgangs LDL-C værdi (FH?), compliance og/eller statinintolerans

1) Prøv et andet statin (2-3 statiner forsøges)²⁾

2) Forsøg pausering og dosisreduktion

3) Forsøg med lav dosis statin med lang halveringstid* 1-3 x ugentligt

Spørgsmål og henvisning til Lipidambulatorium eller Lipidklinik

* atorvastatin, rosuvastatin

1) Dansk Cardiologisk Selskabs holdningspapir om Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) 2012

2) Dansk Cardiologisk Selskab. National behandlingvejledning kap 28: